

Cuestionario corto para la evaluación de la Vejiga Hiperactiva. Cuestionario de Autoevaluación del Control de la Vejiga (CACV)

N° ID: <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	Por favor, anote el NÚMERO aplicable a su caso en las casillas indicadas por las flechas, teniendo en cuenta lo siguiente: EN ABSOLUTO = 0 UN POCO = 1 BASTANTE = 2 MUCHO = 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÍNTOMAS	MOLESTIA
<input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="text"/> ← ¿Le resulta difícil retener la orina cuando siente la necesidad urgente de orinar? +	<input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="text"/> ← ¿En qué medida le molesta? +
<input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="text"/> ← ¿Necesita ir al lavabo con demasiada frecuencia durante el día? +	<input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="text"/> ← ¿En qué medida le molesta? +
<input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="text"/> ← ¿Se despierta por la noche con la necesidad urgente de orinar? +	<input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="text"/> ← ¿En qué medida le molesta? +
<input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="text"/> ← ¿Tiene pérdidas de orina?	<input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="text"/> ← ¿En qué medida le molesta?

**AHORA, SUME LAS PUNTUACIONES DE CADA COLUMNA E INTRODUZCA
LOS RESULTADOS EN ESTAS CASILLAS**

<input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="text"/> ← Mi puntuación de “Síntomas”	<input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="text"/> ← Mi puntuación de “Molestia”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTUACIÓN DE SÍNTOMAS	PUNTUACIÓN DE “MOLESTIA”	ESTA PUNTUACIÓN DE “MOLESTIA” SIGNIFICA
0	0	No tiene molestias debido a problemas urinarios
1-3	1-3	Sus síntomas le molestan ligeramente
4-6	4-6	Sus síntomas le molestan bastante
7-9	7-9	Sus síntomas son una molestia importante para usted
10-12	10-12	Sus síntomas son un problema grave para usted
Si su puntuación de síntomas (arriba indicada) es de 4 o superior, debería consultar a su médico	Si su puntuación de molestia (arriba indicada) es de 1 o superior, puede beneficiarle consultar a su médico	

IMPORTANTE

Si observa sangre en la orina, tiene dificultades para orinar o siente dolor al orinar, usted **DEBE** consultar a su médico

**Validación en España del Cuestionario de Autoevaluación del Control de la Vejiga (CACV).
Un instrumento útil para detectar y evaluar el síndrome de Vejiga Hiperactiva en el primer nivel asistencial.**

España Pons M, Puig Clota M, Dilla T, Rebollo Álvarez P; Actas Urol Esp. 2006;30(10):1017-24.
Basra R, et al. Eur Urol 2007;52:230-238